

中等度催吐性リスク（特定薬剤）個別制吐療法設定

カルボプラチン（婦人科） AUC $\geq$ 4
①アプレピタントCap 125mg（day1）、80mg（day2-3）
②パロノセトロン点滴静注0.75mg（day1）
③デキサート注 4.95mg（day1）

カルボプラチン（肺癌） AUC $\geq$ 4
①アプレピタントCap 125mg（day1）、80mg（day2-3）
②パロノセトロン点滴静注0.75mg（day1）
③デキサート注 9.9mg（day1）
④デカドロン錠4mg 2錠1× or デキサート注6.6mg（day2-4）

カルボプラチン（乳癌） AUC $\geq$ 4
①アプレピタントCap 125mg（day1）、80mg（day2-3）
②パロノセトロン点滴静注0.75mg（day1）
③デキサート注 4.95mg（day1）
④デカドロン錠4mg 1錠1×（day2-3）

カルボプラチン（その他）
①アプレピタントCap 125mg（day1）、80mg（day2-3）
②グラニセトロン静注液1mg（day1）
③デキサート注 4.95mg（day1）
④デカドロン錠4mg 1錠1×（day2-3）

オキサリプラチン
①グラニセトロン静注液1mg（day1）
②デキサート注 9.9mg（day1）
※末梢投与レジメンの場合：前投薬内に6.6mg+オキサリプラチン内に3.3mg
③デカドロン錠4mg 2錠1×（day2-3）

イリノテカン；weekly投与
①グラニセトロン静注液1mg（day1）
②デキサート注 9.9mg（day1）

イリノテカン；Biweekly投与（150mg/m ² 以上）
①パロノセトロン点滴静注0.75mg（day1）
②デキサート注 9.9mg（day1）
③デカドロン錠4mg 2錠1×（day2-3）