

当院コード	レジメン名	コメント	催吐性リスク	投与期間	コース期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
LU-NS001	PTX+CBDCA(3週毎)外来03NSCLC	NSCLCに対する化学療法 3 weekly	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	パクリタール注射液:200mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注:AUC6 Day1
LU-NS002	PTX/CBDCA(3投1休) 外来03NSCLC	day1,8,15:PTX、day1: CBDCA 28日目休薬完了	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	15	13	パクリタール注射液:70mg/m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注:AUC5 Day1
LU-NS004	CBDCA+PTX+Bev(3週毎)外来03NSCLC	3週毎 最大6J-ス	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	パクリタール注射液:200mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注:AUC6 Day1 ベバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1
LU-NS005	weeklyPTX(3投1休)外来03NSCLC	3投1休	軽度催吐性リスク	15	13	パクリタール注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15
LU-NS006	CBDCA+nab-PAC（3週毎） 外来03NSCLC	3週毎 [CBDCA : day1、nab-PAC : day1,8,15（毎週）]	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	15	6	アブラキシサン点滴静注:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注:AUC6 Day1
LU-NS007	DTX+CDDP(3週毎)外来03NSCLC	進行NSCLC、3 週毎	高度催吐性リスク	1	20	ドセタキセル点滴静注:60mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注:80mg/m ² Day1
LU-NS009	CBDCA+DTX(3週毎)外来03非小細胞肺癌	day1DTX、CBDCA 3 週毎 6 サイクル	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	ドセタキセル点滴静注:60mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注:AUC5 Day1
LU-NS010	Docetaxel(3 週毎)外来03NSCLC	3 週毎	軽度催吐性リスク	1	20	ドセタキセル点滴静注:60mg/m ² Day1
LU-NS011	DTX+Ramucirumab療法(3週毎)外来03NSCLC	day1:サイラム 10mg/kg、ドセタセル 60mg/m ²	軽度催吐性リスク	1	20	サイラムザ点滴静注:10mg/kg Day1 ドセタキセル点滴静注:60mg/m ² Day1
LU-NS012	CDDP+PEM(3週毎)外来03NSCLC	3週毎	高度催吐性リスク	1	20	ペメトレキセド点滴静注:500mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注:75mg/m ² Day1
LU-NS013	CDDP+PEM+Bev(3週毎)外来03非小細胞肺癌	day1PEM,CDDP,Bev 3 週毎, 6 サイクル	高度催吐性リスク	1	20	ベバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1 ペメトレキセド点滴静注:500mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注:75mg/m ² Day1
LU-NS014	CBDCA+PEM(3週毎)外来03非小細胞肺癌	day1PEM、CBDCA 3 週毎 6 サイクル	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	ペメトレキセド点滴静注:500mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注:AUC6 Day1
LU-NS015	CBDCA+PEM+Bev(3週毎)外来03非小細胞肺癌	day1CBDCA,PEM,Bev 3 週毎, 6 サイクル	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	ベバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1 ペメトレキセド点滴静注:500mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注:AUC6 Day1
LU-NS016	3wPEM(3週毎)外来03NSCLC	3 週毎	軽度催吐性リスク	1	20	ペメトレキセド点滴静注:500mg/m ² Day1
LU-NS017	PEM+Bev維持療法(3週毎)外来03NSCLC	3週毎 PDまで	軽度催吐性リスク	1	20	ベバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1 ペメトレキセド点滴静注:500mg/m ² Day1
LU-NS018	Bevacizumab単独(3週毎)外来03非小細胞肺癌	day1Bev 3 週毎 PDまで	最小度催吐性リスク	1	20	ベバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1
LU-NS019	GEM（3投1休） 外来03NSCLC	NSCLCに対する化学療法	軽度催吐性リスク	15	13	ゲムシタピン点滴静注 :1000mg/m ² Day1 Day8 Day15

LU-NS020	GEM/CBDCA(2投1休)外来03NSCLC	day1,8:GEM、day1: CBDCA 3週 毎 6サイクル	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	8	13	ゲムシタピン点滴静注用 :1000mg/m ² Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1
LU-NS021	GEM/CDDP (2投1休)外来03NSCLC	day1,8:GEM、day1:CDDP 21日 目休薬完了	高度催吐性リスク	8	13	ゲムシタピン点滴静注用 :1000mg/m ² Day1 Day8 シスプラチン点滴静注:80mg/m ² Day1
LU-NS022	GEM/VNR(2投1休) 外来03NSCLC	2投1休 3～6コース	軽度催吐性リスク	8	13	ゲムシタピン点滴静注用 :1000mg/m ² Day1 Day8 ロゼウス静注液:25mg/m ² Day1 Day8
LU-NS023	CPT11/CDDP(80)(3投1休)外来 03NSCLC	day1,8,15:CPT11、day1:CDDP 28日目休薬完了	高度催吐性リスク	15	13	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:60mg/m ² Day1 Day8 Day15 シスプラチン点滴静注:80mg/m ² Day1
LU-NS024	CPT11 (3投1休) 外来03NSCLC	SCLC NSCLCに対する化学療法	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	15	13	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100mg/m ² Day1 Day8 Day15
LU-NS025	CDDP/VNR(2投1休) 外来03NSCLC	進行NSCLC、day1,8:VNR、 day1:CDDP 21日目休薬完了	高度催吐性リスク	8	13	ロゼウス静注液:25mg/m ² Day1 Day8 シスプラチン点滴静注:80mg/m ² Day1
LU-NS026	VNR (3投1休) 外来03NSCLC	3投1休 最大6コース	軽度催吐性リスク	15	13	ロゼウス静注液:25mg/m ² Day1 Day8 Day15
LU-NS027	CBDCA+TS-1(3週毎)外来03NSCLC	3週毎 最大 6コース day1タ-15 朝 : S-1	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1
LU-NS028	TS-1+CDDP+RT(4週毎)外来 03NSCLC	4週毎 最大 4コース day1 : CDDP、day1-14 : TS-1	高度催吐性リスク	1	27	シスプラチン点滴静注:40mg/m ² Day1 Day8
LU-NS029	Ramucirumab+Erlotinib療法(2週毎) 外来03肺癌	Ramucirumab : day1, Erlotinib : 連日内服 PDまで	最小度催吐性リスク	1	13	サイラムザ点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1
LU-NS030	Nivolumab 【2週毎】 外来03非小細胞 肺癌	進行非小細胞肺癌に対する nivolumab療法	最小度催吐性リスク	1	13	オブジーボ点滴静注液:240mg Day1
LU-NS031	Nivolumab 【4週毎】 外来03非小細胞 肺癌	進行非小細胞肺癌に対する nivolumab療法 PDまで	最小度催吐性リスク	1	27	オブジーボ点滴静注液:480mg Day1
LU-NS032	【術前】 NIVO+CBDCA+PTX療法 外 来03 NSCLC	※最大3コース NSCLC (Non- Sq/Sq) day1 ; NIVO, CBDCA, PTX	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	パクリタール点滴静注液:200mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1
LU-NS033	【術前】 NIVO+CBDCA+PEM療法 外 来03 NSCLC	※最大3コース NSCLC (Non- Sq) day1 ; NIVO, CBDCA, PEM	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	パクリタール点滴静注液:500mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1
LU-NS034	【術前】 NIVO+CDDP+PEM療法 外 来03 NSCLC	※最大3コース NSCLC (Non- Sq) day1 ; NIVO, CDDP, PEM	高度催吐性リスク	1	20	パクリタール点滴静注液:500mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注:75mg/m ² Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1
LU-NS035	PEMBRO 【3週毎】 療法 外来 03NSCLC	PDL1陽性の進行非小細胞肺癌に対 するPEMBRO療法	最小度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴:200mg Day1
LU-NS036	PEMBRO 【6週毎】 療法 外来 03NSCLC	PDL1陽性の進行非小細胞肺癌に対 するPEMBRO療法 PDまで	最小度催吐性リスク	1	41	キイトルーダ点滴:400mg Day1
LU-NS037	CBDCA+PEM+Pembro(3週毎)外来 03NonSq-NSCLC	day1Pembro、PEM、CBDCA 3 週毎 4サイクル	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	パクリタール点滴静注液:500mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 キイトルーダ点滴:200mg Day1

LU-NS038	CDDP+PEM+Pembro(3週毎)外来 03NonSq-NSCLC	day1Pembro、PEM、CDDP (ジョ イトレージン) 3 週毎 4 サイ クル	高度催吐性リスク	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注:75mg/m ² Day1 キイトルーダ点滴:200mg Day1
LU-NS039	PEM+Pembro(3週毎)外来03NonSq- NSCLC	day1Pembro,PEM 3 週毎 キイト ルーダ総投与数として最大35コース	軽度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴:200mg Day1 ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1
LU-NS040	CBDCA+PTX+Pembro(3週毎)外来 03Sq-NSCLC	day1 Pembro,PTX,CBDCA 3 週 毎 4 サイクル	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	パ [®] カサネシ注射液:200mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 キイトルーダ点滴:200mg Day1
LU-NS041	CBDCA/nab-PTX/Pembro (3週毎) 外 来03Sq-NSCLC	3週毎 [CBDCA、Pembro : day1、nab-PAC : day1,8,15 (毎 週)]	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	15	6	アブラキサン点滴静注用:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 キイトルーダ点滴:200mg Day1
LU-NS042	Atezolizumab(3週毎)外来03非小細胞 肺癌		最小度催吐性リスク	1	20	テセントリク点滴静注:1200mg Day1
LU-NS043	CBDCA+nab-PTX+ATEZO(3週毎)外 来03NonSq-NSCLC	3週毎 [CBDCA、ATEZO : day1、 nab-PAC : day1,8,15 (毎週)]	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	15	6	アブラキサン点滴静注用:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 テセントリク点滴静注:1200mg Day1
LU-NS044	CBDCA+PEM+ATEZO(3週毎)外来 03NonSq-NSCLC	day1 : ATEZO、PEM、CBDCA 3 週毎 4 サイクル	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 テセントリク点滴静注:1200mg Day1
LU-NS045	CDDP+PEM+ATEZO(3週毎)外来 03NonSq-NSCLC	day1ATEZO、PEM、CDDP (ジョ イトレージン) 3 週毎 4 サイクル	高度催吐性リスク	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注:75mg/m ² Day1 テセントリク点滴静注:1200mg Day1
LU-NS046	PEM+ATEZO(3週毎)外来03NonSq- NSCLC	day1ATEZO,PEM 3 週毎	軽度催吐性リスク	1	20	テセントリク点滴静注:1200mg Day1 ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1
LU-NS047	CBDCA+PTX+Bev+Atezo(3週毎)外来 03NonSq-NSCLC	day1:Atezo,Bev,PTX,CBDCA 3 週毎 最大 4 コース	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	パ [®] カサネシ注射液「ネビ [®] 」(規格なし):175mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液「NK」(規格なし):AUC6 Day1 ベバシズマブBS点滴静注(規格なし):15mg/kg Day1 テセントリク点滴静注1200mg20mL:1200mg Day1
LU-NS048	Bev+Atezo(3週毎)外来03NonSq- NSCLC	day1 : Bev、Atezo 3 週毎 PD まで	最小度催吐性リスク	1	20	ベバシズマブBS点滴静注(規格なし):15mg/kg Day1 テセントリク点滴静注1200mg20mL:1200mg Day1
LU-NS049	Durvalumab(NSCLC)療法(4週毎)外来 03非小細胞肺癌	原則同時放射線化学療法後、non- PD症例に対して、42日以内に開始 する。投与期間12ヶ月間まで。 R5/12変更	最小度催吐性リスク	1	27	イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1
LU-NS050	【1Cycle】NIVO+IPI+PTX+CBDC療法 外来03 NSCLC	【1cycle】 【2cycle】の順で1 クールのみ実施する。以降は維持 療法へ day1 : NIVO,IPI,PTX,CBDCA	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	パ [®] カサネシ注射液:200mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1
LU-NS051	【2Cycle】NIVO+(IPI)+PTX+CBDC療法 外来03 NSCLC	【1cycle】 【2cycle】の順で1 クールのみ実施する。以降は維持 療法へ day15 : NIVO,PTX,CBDCA	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	パ [®] カサネシ注射液:200mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1
LU-NS052	【1 Cycle】NIVO+IPI+CBDC+PEM療法 外来03NSCLC	【1cycle】 【2cycle】の順で1 クールのみ実施する。以降は維持 療法へ day1 : NIVO,IPI,PEM,CBDCA	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1
LU-NS053	【2Cycle】NIVO+(IPI)+CBDC+PEM療法 外来03NSCLC	【1cycle】 【2cycle】の順で1 クールのみ実施する。以降は維持 療法へ day15 : NIVO,PEM,CBDCA	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1
LU-NS054	【1Cycle】NIVO+IPI+PEM+CDDP療法 外来03NSCLC	【1cycle】 【2cycle】の順で1 クールのみ実施する。以降は維持 療法へ day1 : NIVO,IPI,PEM,CDDP	高度催吐性リスク	1	20	オブジーボ点滴静注液:360mg Day1 ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注:75mg/m ² Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1
LU-NS055	【2 Cycle】NIVO+(IPI)+PEM+CDDP療法 外来03NSCLC	【1cycle】 【2cycle】の順で1 クールのみ実施する。以降は維持 療法へ day15 : NIVO,PEM,CDDP	高度催吐性リスク	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注:75mg/m ² Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1

LU-NS056	NIVO+IPI【2wk】療法 外来 03NSCLC	PDまで day1：NIVO,IPI day15：NIVO day29：NIVO	最小度催吐性リスク	29	13	オブジーボ点滴静注液:240mg Day1 Day15 Day29 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1
LU-NS057	NIVO/IPI【3wk】療法 外来03NSCLC	PDまで day1：NIVO,IPI day22：NIVO	最小度催吐性リスク	22	20	オブジーボ点滴静注液:360mg Day1 Day22 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1
LU-NS058	Trem+Durva+PEM+CBDCA療法 外来03NSCLC(非扁平)	★4サイクル。以降は維持療法 (Trem/Durva/PEM)へ day1： Trem,Durva,PEM,CBDCA	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	ベムトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1 イグ*1ド点滴静注:75mg Day1
LU-NS059	Trem+Durva+PEM+CDDP療法 外来03NSCLC(非扁平)	★4サイクル。以降は維持療法 (Trem/Durva/PEM)へ day1： Trem,Durva,PEM,CDDP	高度催吐性リスク	1	20	ベムトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 シスプラチン点滴静注液:75mg/㎡ Day1 イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1 イグ*1ド点滴静注:75mg Day1
LU-NS060	Trem+Durva+PEM+CBDCA/CDDP維持療法前半 外来03NSCLC	★1サイクル。以降は維持療法 (Durva/PEM)へ day1： Durva,PEM day29： Trem,Durva,PEM	軽度催吐性リスク	29	27	ベムトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 Day29 イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1 Day29 イグ*1ド点滴静注:75mg Day29
LU-NS061	Trem+Durva+PEM+CBDCA+CDDP維持療法後半	★PDまで。 day1：Durva,PEM	軽度催吐性リスク	1	27	ベムトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1
LU-NS062	Trem+Durva+nab-PTX+CBDCA療法 外来03NSCLC	★4サイクル。以降は維持療法 (Trem/Durva)へ day1： Trem,Durva,nab-PTX,CBDCA day8,15：nab-PTX	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	15	6	イグ*1ド点滴静注:75mg Day1 アブラキサン点滴静注用:100mg/㎡ Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1
LU-NS063	Trem+Durva+nab-PTX+CBDCA維持療法前半 外来03 NSCLC	★1サイクル。以降は維持療法 (Durva)へ day1：Durva day29：Trem,Durva	最小度催吐性リスク	29	27	イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1 Day29 イグ*1ド点滴静注:75mg Day29
LU-NS064	Trem+Durva+nab-PTX+CBDCA維持療法後半 外来03 NSCLC	★PDまで NSCLC (Non-Sq/Sq) day1：Durva	最小度催吐性リスク	1	27	イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1
LU-NS065	【11-13日目/80kg未満】 AMIVA+CBDCA+PEM 3w外来 03NSCLC	PEM：day1,CBDCA：day1,7ミ*ン タ77：day1,2,8,15 3週毎 11-13 目のみ	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	15	6	ベムトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 ライブリバント点滴静注:350mg Day1 ライブリバント点滴静注:1050mg Day2 ライブリバント点滴静注:1400mg Day8 Day15
LU-NS066	【21-23日目/80kg未満】 AMIVA+CBDCA+PEM 3w外来 03NSCLC	day1:PEM,CBDCA,7ミ*ンタ77 3週 毎 21-23目のみ	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	ベムトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 ライブリバント点滴静注:1400mg Day1
LU-NS067	【3,4,7-13日目/80kg未満】 AMIVA+CBDCA+PEM 3w外来 03NSCLC	day1:PEM,CBDCA,7ミ*ンタ77 3週 毎 3,4,7-13目のみ	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	ベムトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 ライブリバント点滴静注:1750mg Day1
LU-NS068	【51-53日目〜/80kg未満】AMIVA+PEM 維持 3w外来03NSCLC	day1:PEM,7ミ*ンタ77 3週毎 51-53 目以降(維持療法)※PDまで	軽度催吐性リスク	1	20	ライブリバント点滴静注:1750mg Day1 ベムトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1
LU-NS069	【11-13日目/80kg以上】 AMIVA+CBDCA+PEM 3w外来 03NSCLC	PEM：day1,CBDCA：day1,7ミ*ン タ77：day1,2,8,15 3週毎 11-13目 のみ	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	15	6	ライブリバント点滴静注:350mg Day1 ライブリバント点滴静注:1400mg Day2 ライブリバント点滴静注:1750mg Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 ベムトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1
LU-NS070	【21-23日目/80kg以上】 AMIVA+CBDCA+PEM 3w外来 03NSCLC	day1:PEM,CBDCA,7ミ*ンタ77 3週 毎 21-23目のみ	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	ベムトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 ライブリバント点滴静注:1750mg Day1
LU-NS071	【3,4,7-13日目/80kg以上】 AMIVA+CBDCA+PEM 3w外来 03NSCLC	day1:PEM,CBDCA,7ミ*ンタ77 3週 毎 3,4,7-13目のみ	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	ベムトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 ライブリバント点滴静注:2100mg Day1
LU-NS072	【51-53日目〜/80kg以上】AMIVA+PEM 維持 3w外来03NSCLC	day1:PEM,7ミ*ンタ77 3週毎 51-53 目以降(維持療法)※PDまで	軽度催吐性リスク	1	20	ベムトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 ライブリバント点滴静注:2100mg Day1
LU-S001	CPT11/CDDP(60)(3投1休)外来 03SCLC	進展型 day1,8,15:CPT11、 d1:CDDP 28日目休薬完了	高度催吐性リスク	15	13	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:60mg/㎡ Day1 Day8 Day15 シスプラチン点滴静注:60mg/㎡ Day1

LU-S002	CPT11（3投1休）外来03SCLC	SCLC NSCLCに対する化学療法	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	15	13	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100mg/㎡ Day1 Day8 Day15
LU-S005	CBDC/Vp16(3週毎)外来03SCLC	day1,2,3:VP16、day1:CBDC 21日目休薬完了	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	3	18	IF [®] 点滴静注液:100mg/㎡ Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1
LU-S007	amrubicin(3週毎)外来03SCLC	day1-3:AMR(40mg/㎡) 21日目休薬完了	中等度催吐性リスク	3	18	カルセド注:40mg/㎡ Day1 Day2 Day3
LU-S008	CDDP/AMR(3週毎)外来03SCLC	day1,2,3:AMR、day1:CDDP 21日目休薬完了	高度催吐性リスク	3	18	カルセド注:40mg/㎡ Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注:60mg/㎡ Day1
LU-S009	ナリニカ(NGT)単独療法(3週毎d1-5)外来03小細胞肺癌	出荷停止(R7.5～)ナリニカ:d1-5, 3週毎 PDまで	軽度催吐性リスク	5	16	ハイカムチン:1mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
LU-S011	CBDC/Vp16/DURVA(3週毎)外来03SCLC	day1,2,3:VP16、 day1:CBDC,DURVA 21日目休薬完了	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	3	18	IF [®] 点滴静注液:100mg/㎡ Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1
LU-S012	CDDP/VP-16/DURVA(3週毎)外来03SCLC	day1 DURVA、VP-16、CDDP (ショートパルス療法) 3週毎 4サイクル	高度催吐性リスク	3	18	イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1 IF [®] 点滴静注液:100mg/㎡ Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注:80mg/㎡ Day1
LU-S013	DURVA(SCLC)維持療法(4週毎)外来03小細胞肺癌	CBDC or CDDP/VP-16/DURVA療法 4コース終了後の維持療法	最小度催吐性リスク	1	27	イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1
LU-S014	【11-15目】Tarlatab療法【4週毎】外来03小細胞肺癌	※PDまで。1コース目 Tarlatab : day1.8.15	最小度催吐性リスク	15	13	イムデトラ点滴静注用 1mg :1V Day1 イムデトラ点滴静注用 10mg :1V Day8 Day15
LU-S015	【21-25目～】Tarlatab療法【4週毎】外来03小細胞肺癌	※PDまで。2コース目以降 Tarlatab : day1.15	最小度催吐性リスク	15	13	イムデトラ点滴静注用 10mg :1V Day1 Day15