

当院コード	レジメン名	コメント	催吐性リスク	投与 期間	コース 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
BC001	dose-denseEC療法（2週毎）外来04乳癌	最大4コース	高度催吐性リスク day2-4 経口DEX OFF アロカリス使用	1	13	エピルビン塩酸塩注射液:90mg/m ² Day1 エンドキサン注 :600mg/m ² Day1
BC002	E C点滴 [EPI/CPA]（3週毎）外来04乳癌	3〜4週毎に繰り返す	高度催吐性リスク day2-4 経口DEX OFF アロカリス使用	1	20	エピルビン塩酸塩注射液:90mg/m ² Day1 エンドキサン注:600mg/m ² Day1
BC003	A C点滴 [ADM/CPA]（3週毎）外来04乳癌	3〜4週毎に繰り返す	高度催吐性リスク day2-4 経口DEX OFF アロカリス使用	1	20	ドキシソルビン塩酸塩注射液:60mg/m ² Day1 エンドキサン注:600mg/m ² Day1
BC004	dose-dense PTX（2週毎）外来04乳癌	EC又はAC後4〜6J-ス day2以降にスプラスタ併用	軽度催吐性リスク	1	13	パクリタキセル注射液:175mg/m ² Day1
BC005	PTX+Bv（4週毎）外来04進行・再発乳癌	PTX：d1,8,15 Bv：d1,15 PDまで	軽度催吐性リスク	15	13	ペバシズマブBS点滴静注:10mg/kg Day1 Day15 パクリタキセル注射液:90mg/m ² Day1 Day8 Day15
BC007	PTX（3投1休）外来04乳癌	day1,8,15を4週繰り返す	軽度催吐性リスク	15	13	パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15
BC008	weeklyPTX（1回分）外来04乳癌	週1回投与	軽度催吐性リスク	1	6	パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1
BC009	DTX75mg（3週毎）外来04乳癌	day1を3〜4週ごと繰り返す	中等度催吐性リスク	1	20	ドセタキセル点滴静注液:75mg/m ² Day1
BC010	B/TC順入替（DTX/CPA）（3週毎）外来04乳癌	3週毎	中等度催吐性リスク	1	20	エンドキサン注:600mg/m ² Day1 ドセタキセル点滴静注液:75mg/m ² Day1
BC011	T C b（3週毎）外来04乳癌	3週毎 最大6コース	中等度催吐性リスク（特定薬剤） アロカリス使用	1	20	ドセタキセル点滴静注液:75mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
BC012	VNR（2投1休）外来04乳癌	（入院・外来）2投1休 21日目休薬完了	最小度催吐性リスク	8	13	ロゼウス静注液:25mg/m ² Day1 Day8
BC013	VNR（1回分）外来04乳癌	（入院・外来）2投1休の1回分のみ 7日目休薬完了	最小度催吐性リスク	1	6	ロゼウス静注液:25mg/m ² Day1
BC014	I/Fアリ(2投1休)外来04乳癌	3週毎（day1,8投与）手術不能又は再発乳癌	軽度催吐性リスク	8	13	エリブリンメシル酸塩静注液:1.4mg/m ² Day1 Day8
BC015	I/Fアリ(1回分)外来04乳癌	2投1休の1回分 手術不能又は再発乳癌	軽度催吐性リスク	1	6	エリブリンメシル酸塩静注液:1.4mg/m ² Day1
BC016	CBDCA+GEM（2投1休）外来04乳癌	3週毎（day1,8）PDまで 進行性トリプル陽性乳癌	中等度催吐性リスク 準拠	8	13	カルボプラチン点滴静注液:AUC2 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注用 :1000mg/m ² Day1 Day8
BC017	GEM/PTX（2投1休）外来04乳癌	day1,8を3週毎繰り返す。2クール目からデキサメタゾン減量可。	軽度催吐性リスク	8	13	ゲムシタビン点滴静注用:1000mg/m ² Day1 Day8 パクリタキセル注射液:175mg/m ² Day1
BC018	G T 8 0 weekly（2投1休）外来04乳癌	day1,8を3週毎繰り返す：2投1休（PTX+GEM）	軽度催吐性リスク	8	13	軽度催吐性リスク

BC019	GEM（2投1休）外来04乳癌	2投1休	軽度催吐性リスク	8	13	ゲムシタピン点滴静注用：1250mg/m ² Day1 Day8
BC020	GEM（1回分）外来04乳癌	2投1休の1回分のみ	軽度催吐性リスク	1	6	ゲムシタピン点滴静注用：1250mg/m ² Day1
BC021	アブラキサン（3週毎）外来04乳癌	3週毎	軽度催吐性リスク	1	20	アブラキサン点滴静注用：260mg/m ² Day1
BC022	ドキシソルビシン単剤療法（3週毎）外来04軟部腫瘍	最大6コース 進行性軟部腫瘍	高度催吐性リスク アロカリス使用	1	20	ドキシソルビシン塩酸塩注射用：75mg/m ² Day1
BC023	エンハーツ（3週毎）外来04進行・再発乳癌	3週毎 化学療法歴のあるHER2陽性の手術不能又は再発乳癌（標準的な治療が困難な場合に限る）	高度催吐性リスク アロカリス使用	1	20	エンハーツ点滴静注用：5.4mg/kg Day1
BC024	カドサイラ（3週毎）外来04進行・再発乳癌	3週毎 HER2陽性の手術不能又は再発乳癌（トラスツマブ [®] 及びサツタキ [®] の既往治療例）	軽度催吐性リスク	1	20	カドサイラ点滴静注用（規格なし）：3.6mg/kg Day1
BC025	フェスゴ皮下注IN（初回）（3週毎）外来04乳癌	3週毎 術前・術後薬物療法の場合は12ヶ月まで HER2陽性乳癌	最小度催吐性リスク	1	20	フェスゴ配合皮下注 I N 15mL/V：1V Day1
BC026	フェスゴ皮下注MA（2回目以降）（3週毎）外来04乳癌	3週毎 術前・術後薬物療法の場合は12ヶ月まで HER2陽性乳癌	最小度催吐性リスク	1	20	フェスゴ配合皮下注 MA 10mL/V：1V Day1
BC027	Tmab【8mg/kg】（初回）（3週毎）外来04乳癌	初回trweeklyHER（トラスツマブ [®] ）（8mg/kg）	最小度催吐性リスク	1	20	トラスツマブBS点滴静注用：8mg/kg Day1
BC028	Tmab【6mg/kg】（2回目～）（3週毎）外来04乳癌	乳癌術後 3wHER（トラスツマブ [®] ）（6mg/kg）	最小度催吐性リスク	1	20	トラスツマブBS点滴静注用：6mg/kg Day1
BC029	HPD【Tmab 8mg/kg】（初回）（3週毎）外来04乳癌	3週毎 PDまで HER2陽性 進行・再発乳癌	中等度催吐性リスク	1	20	バージエタ点滴静注：840mg Day1 トラスツマブBS点滴静注用：8mg/kg Day1 ドセタキセル点滴静注液：75mg/m ² Day1
BC030	HPD【Tmab 6mg/kg】（2回目～）（3週毎）外来04乳癌	3週毎 PDまで HER2陽性 進行・再発乳癌	中等度催吐性リスク	1	20	バージエタ点滴静注：420mg Day1 トラスツマブBS点滴静注用：6mg/kg Day1 ドセタキセル点滴静注液：75mg/m ² Day1
BC031	TCbHP【Tmab 8mg/kg】（初回）（3週毎）外来04乳癌	3週毎 最大6コース	中等度催吐性リスク（特定薬剤） アロカリス使用	1	20	ドセタキセル点滴静注液：75mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液：AUC5.5 Day1 バージエタ点滴静注：840mg Day1 トラスツマブBS点滴静注用：8mg/kg Day1
BC032	TCbHP【Tmab 6mg/kg】（2回目～）（3週毎）外来04乳癌	3週毎 最大6コース	中等度催吐性リスク（特定薬剤） アロカリス使用	1	20	ドセタキセル点滴静注液：75mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液：AUC5.5 Day1 バージエタ点滴静注：420mg Day1 トラスツマブBS点滴静注用：6mg/kg Day1
BC033	wPTX+パ [®] -ジ [®] エタ+Tmab【8mg/kg】（初回）（3週毎）外来04乳癌	day1：Pmab(840mg/body) Tmab(8mg/kg) PTX(80mg/m ²) day8,15は別レジメン	軽度催吐性リスク	1	6	バージエタ点滴静注：840mg Day1 トラスツマブBS点滴静注用：8mg/kg Day1 パクリタキセル注射液：80mg/m ² Day1
BC034	wPTX+パ [®] -ジ [®] エタ+Tmab【6mg/kg】（2回目～）（3週毎）外来04乳癌	day1：Pmab(420mg/body) Tmab(6mg/kg) PTX(80mg/m ²) day8,15は別レジメン	軽度催吐性リスク	1	6	バージエタ点滴静注：420mg Day1 トラスツマブBS点滴静注用：6mg/kg Day1 パクリタキセル注射液：80mg/m ² Day1
BC035	EP [®] リ [®] ン+パ [®] -ジ [®] エタ+Tmab【8mg/kg】（初回）（3週毎）外来04乳癌	3週毎 PDまで HER2陽性 進行・再発乳癌 P-mab/T-mab：day1 HAL：day1,8	軽度催吐性リスク	8	13	バージエタ点滴静注：840mg Day1 トラスツマブBS点滴静注用：8mg/kg Day1 エリブリンメシル酸塩静注液：1.4mg/m ² Day1 Day8
BC036	EP [®] リ [®] ン+パ [®] -ジ [®] エタ+Tmab【6mg/kg】（2回目～）（3週毎）外来04乳癌	3週毎 PDまで HER2陽性 進行・再発乳癌 P-mab/T-mab：day1 HAL：day1,8	軽度催吐性リスク	8	13	バージエタ点滴静注：420mg Day1 トラスツマブBS点滴静注用：6mg/kg Day1 エリブリンメシル酸塩静注液：1.4mg/m ² Day1 Day8

BC037	wPTX+Tmab【4mg/kg】(初回)外来04乳癌	週1回投与 初回	軽度催吐性リスク	1	6	パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:4mg/kg Day1
BC038	wPTX+Tmab【2mg/kg】(2回目～)外来04乳癌	週1回投与 2回目以降	軽度催吐性リスク	1	6	パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:2mg/kg Day1
BC039	DTX+Tmab【8mg/kg】(初回)(3週毎)外来04乳癌	術後乳癌は最大4ヶ月前まで 進行・再発乳癌はPDまで	中等度催吐性リスク	1	20	ドセタキセル点滴静注液:75mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1
BC040	DTX+Tmab【6mg/kg】(2回目～)(3週毎)外来04乳癌	術後乳癌は最大4ヶ月前まで 進行・再発乳癌はPDまで 75mg/kg	中等度催吐性リスク	1	20	ドセタキセル点滴静注液:75mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1
BC041	TC+Tmab【8mg/kg】(初回)(3週毎)外来04乳癌	3週毎	高度催吐性リスク day2-4 経口DEX OFF	1	20	エンドキサン注 :600mg/m ² Day1 ドセタキセル点滴静注液:75mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1
BC042	TC+Tmab【6mg/kg】(2回目～)(3週毎)外来04乳癌	3週毎	中等度催吐性リスク	1	20	エンドキサン注 :600mg/m ² Day1 ドセタキセル点滴静注液:75mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1
BC044	TCbH【Tmab 6mg/kg】(2回目～)(3週毎)外来04乳癌	3週毎 最大6コース	中等度催吐性リスク (特定薬剤) アロカリス使用	1	20	ドセタキセル点滴静注液:75mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1
BC045	VNR(2投1休)+wTmab【2mg/kg】(2回目～)外来04乳癌	VNR:2投1休、HER:weekly 21日目休薬完了	最小度催吐性リスク	15	6	ロゼウス静注液:25mg/m ² Day1 Day8 トラスツズマブBS点滴静注用:2mg/kg Day1 Day8 Day15
BC046	VNR+Tmab【2mg/kg】(2回目～)(1回分)外来04乳癌	VNR:2投1休、HER:weeklyの1回分のみ 7日目休薬完了	最小度催吐性リスク	1	6	ロゼウス静注液:25mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:2mg/kg Day1
BC047	ATEZO+nab-PTX 外来04乳癌	トリプルネガティブ PL-D1陽性の手術不能又は再発乳癌 ATEZO: day1,15 nab-PTX: day1,8,15	軽度催吐性リスク	15	13	アブラキサン点滴静注用:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 デセントロク点滴静注:840mg Day1 Day15
BC048	PEMBRO+PTX+CBDCA (3週ごと) 外来04乳癌	day1,8,15:PTX、day1: CBDCA、PEMBRO 21日目休薬完了 4コースまで	中等度催吐性リスク (特定薬剤) アロカリス使用	15	6	キイトルーダ点滴:200mg Day1 パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1
BC049	PEMBRO+EC [EPI/CPA]療法 (3週毎) 外来04乳癌	術前化学療法 3週毎 4コースまで	高度催吐性リスク day2-4 経口DEX OFF アロカリス使用	1	20	エビルピシン塩酸塩注射液:90mg/m ² Day1 エンドキサン注 :600mg/m ² Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg Day1
BC050	Pembro+GEM+CBDCA(3週毎)外来04乳癌	day1Pembro、CBDCA、GEM day8 CBDCA、GEM 3週毎	中等度催吐性リスク 準拠	8	13	ゲムシタビン点滴静注用 :1000mg/m ² Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液:AUC2 Day1 Day8 キイトルーダ点滴:200mg Day1
BC051	サタス・マ・コ・ビ・テ・カ・(ト・デ・ル・ビ)療法外来04進行・再発乳癌	【3週毎】 サタス・マ・コ・ビ・テ・カ : day1,8 ※PDまで	高度催吐性リスク アロカリス使用	8	13	トロデルビ点滴静注用:10mg/kg Day1 Day8
BC052	ダ・ト・ホ・タ・マ・デ・ル・ビ・カ・療法【3週毎】 外来04乳癌	ダ・ト・ホ・タ・マ・デ・ル・ビ・カ・療法【3週毎】 化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌	高度催吐性リスク アロカリス使用	1	20	ダトロウエイ点滴静注用:6mg/kg Day1