

当院コード	レジメン名	コメント	催吐性リスク	投与期間	コース期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
ESC005	wPTX(100mg/sqm 6投1休)外来05食道癌	weekly 6投1休 進行・再発食道癌	軽度催吐性リスク	1	6	パ® 97注射液:100mg/㎡ Day1
ESC008	DTX70(3週毎)外来05食道癌	3週毎	軽度催吐性リスク	1	20	ドセタキセル点滴静注液:70mg/㎡ Day1
ESC009	mFOLFOX6(2週毎)外来05食道癌	14日目休薬完了	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	13	レボホリナート点滴静注用:200mg/㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注:400mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注:2400mg/㎡ Day1
ESC012	Nivolumab(2週毎)外来05食道癌	進行・再発胃癌、食道癌、MSI-High大腸癌、原発不明癌に対するnivolumab療法【240mg/body】	最小度催吐性リスク	1	13	オブジーボ点滴静注液:240mg Day1
ESC013	Nivolumab(4週毎)480mg 外来05食道癌	進行・再発胃癌、食道癌、MSH-High大腸癌、原発不明癌に対するNivolumab (4週毎) 480mg/body	最小度催吐性リスク	1	27	オブジーボ点滴静注液:480mg Day1
ESC014	Pembrolizum療法200mg/body (3週毎)外来03食道癌	CPS≥10の食道癌（扁平上皮癌）に対するPEMBRO療法	最小度催吐性リスク	1	20	キートン®点滴:200mg Day1
ESC015	Pembrolizum療法400mg/body (6週毎)外来03食道癌	CPS≥10の食道癌（扁平上皮癌）に対するPEMBRO療法	最小度催吐性リスク	1	20	キートン®点滴:400mg Day1
ESC016	NIVO/IPI【2wk】療法 外来05食道癌	PDまで day1：NIVO,IPI day15：NIVO day29：NIVO	最小度催吐性リスク	29	13	オブジーボ点滴静注液:240mg Day1 Day15 Day29 ヤーボイ点滴静注液:1.0mg/kg Day1
ESC017	NIVO/IPI【3wk】療法 外来05食道癌	PDまで day1：NIVO,IPI day22：NIVO	最小度催吐性リスク	22	20	オブジーボ点滴静注液:360mg Day1 Day22 ヤーボイ点滴静注液:1.0mg/kg Day1
ESC018	adj Nivolumab 240mg/body(2週毎)外来05 食道癌	adj Nivolumab 240mg/body療法（食道癌術後補助療法）16週までは2週毎、17週以降は480mg/bodyを4週毎	最小度催吐性リスク	1	13	オブジーボ点滴静注液:240mg Day1
ESC019	adj Nivolumab 480mg/body(4週毎)外来05 食道癌	adj Nivolumab 480mg/body(4週毎)（食道癌術後補助療法）治療開始17週以降、最大1年	最小度催吐性リスク	1	27	オブジーボ点滴静注液:480mg Day1