

当院コード	レジメン名	コメント	催吐性リスク	投与 期間	コース 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
GYN001	wCDDPshort (1回分) 外来06子宮頸癌	RTに同時併用 8週以内に計5回施行	高度催吐性リスク	1	6	シスプラチン点滴静注:40mg/m ² Day1
GYN003	TC (3週毎) 外来06卵巣・子宮癌	短時間投与 3週毎	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	パクリタキセル注射液:175mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注:AUC5 Day1
GYN005	ddTC (3週毎) 11-11目外来06卵巣癌	PTX80mg/m ² :day1,8,15 CBDCA:day1の11-11目 (21-11目以降は別レジメン)	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	15	6	パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注:AUC5 Day1
GYN006	ddTC (3週毎) 21-11目以降外来06卵巣癌	PTX80mg/m ² :day1,8,15 CBDCA:day1の21-11目以降 11-11目は別レジメン	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	15	6	パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注:AUC5 Day1
GYN007	DC (DOC/CBDCA) (3週毎) 外来06卵巣・子宮癌	3週毎	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	ドセタキセル点滴静注:70mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注:AUC5 Day1
GYN008	PLD/CBDCA (4週毎) 外来06卵巣癌	4週毎	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	27	ドキシル注:30mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注:AUC5 Day1
GYN009	GEM/CBDCA (2投1休) 外来06卵巣癌	GEM : day1,8 CBDCA : day1 (2投1休) 最大10ヶ月	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	8	13	ゲムシタピン点滴静注用 :1000mg/m ² Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注:AUC4 Day1
GYN010	CDDP/CPT11(day1)short 外来06子宮頸癌、卵巣癌	3週毎のday1のみ day8,15は別レジメン	高度催吐性リスク	1	6	イリノテカン塩酸塩点滴静注:60mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注:60mg/m ² Day1
GYN011	CPT11のみ (day8,15) 60mg/m ² (1回分) 外来06卵巣癌	(CDDP/CPT-11) 3投1休のCPT-11 1回分 7日目休薬完了	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	6	イリノテカン塩酸塩点滴静注:60mg/m ² Day1
GYN012	PLD (4週毎) 外来06卵巣癌	4週毎	軽度催吐性リスク	1	27	ドキシル注:40mg/m ² Day1
GYN013	GEM (day1) (1回分) 外来06卵巣癌	卵巣癌 GEM単剤 3投1休の1回分 7日目休薬完了	軽度催吐性リスク	1	6	ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m ² Day1
GYN014	CPT11 (day1) 100mg/m ² (1回分) 外来06卵巣癌	CPT-11単剤 3投1休の1回分 7日目休薬完了	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	6	イリノテカン塩酸塩点滴静注:100mg/m ² Day1
GYN015	Nogitecan (3週毎d1-5) 外来06卵巣癌	出荷停止(R7.5～) 代替剤: d1-5, 3週毎	軽度催吐性リスク	5	16	ハイカムチン注射用:1.2mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
GYN016	weeklyPTX (1回分) 外来06卵巣癌	3投1休 (レジメンは1回分のみ)	軽度催吐性リスク	1	6	パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1
GYN017	APshort (ADM/CDDP) (3週毎) 外来03子宮体癌	day1 : ADM (60mg/m ²), CDDP(50mg/m ²), 最大8コース	高度催吐性リスク	1	20	ドキシルピシン塩酸塩注射用:60mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注:50mg/m ² Day1
GYN019	DOC/GEM (day1GEMのみ) 外来06子宮癌	子宮体癌 DOC/GEM day1のみ 7日目休薬完了	軽度催吐性リスク	1	6	ゲムシタピン点滴静注用 :800mg/m ² Day1

GYN020	DOC/GEM（day8）外来06子宮癌	子宮体癌 day8のみ 14日目休薬完了 700-700	軽度催吐性リスク	1	13	ゲムシタピン点滴静注用:800mg/m ² Day1 ドセタキセル点滴静注液:70mg/m ² Day1
GYN023	ADM（3週毎）外来06子宮体癌	3週毎 最大80-ス プラチ抵抗性の子宮 体癌再発	高度催吐性リスク	1	20	ドキシソルピシン塩酸塩注射用:60mg/m ² Day1
GYN024	NGT/CDDP外来06子宮頸癌（3週毎）	出荷停止(R7.5～) NGT : day1- 3(0.75mg/m ²) CDDP : day1(50mg/m ²) 最大80-ス	高度催吐性リスク	3	18	ハイカムチン注射用:0.75mg/m ² Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注:50mg/m ² Day1
GYN026	CPT11（CPT11/CBDCAのday8）外来 06卵巣癌	最大100-ス（CPT-11/CBDCA）の day8のみ 3週毎（休薬完了日: day14） day1は別シケル	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	13	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:60mg/ m ² Day1
GYN027	CBDCA単剤(3週毎)外来06卵巣・子宮 体・子宮頸癌	頸Ca、体Ca、卵巣Ca 3週毎	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1
GYN031	Bev+TC（3週毎）外来06卵巣・卵管・ 腹膜癌	最大100-ス 術後20-ス目から、再発の 場合は10-ス目から.StageⅢ以上/プラチ ン感受性再発。	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	パクリタキセル注射液:175mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1
GYN032	Bev+PLD（4週毎）外来06卵巣癌	4週ごと	軽度催吐性リスク	1	27	ドキシル注:40mg/m ² Day1 ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1
GYN033	Bev+GEM(3週毎)外来06卵巣癌	day1 : 80-ス/ス、ゲムシタピン投 与、day8 : ゲムシタピン投与	軽度催吐性リスク	8	13	ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m ² Day1 Day8
GYN034	Bev+weeklyPTX（4週毎）外来06卵 巣癌	d1,8,15:PTX d1:Bv 4週毎	軽度催吐性リスク	15	13	パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1
GYN035	Bev（3週毎）外来06卵巣・卵管・腹膜 癌	最大160-ス StageⅢ以上/プラチン感 受性再発の卵巣・卵管・腹膜癌（Bv+TC 終了後）	最小度催吐性リスク	1	20	ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1
GYN036	Bev+Olaparib（3週毎）外来06卵巣癌	最大200-ス HRDを有する卵巣癌にお けるBevを含む初回化学療法後の維持 療法	最小度催吐性リスク	1	20	ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1
GYN037	TC+Bev【70-ス】（3週毎）外来06子 宮頸癌	PTX175mg/m ² 、CBDCA : AUC=5、 Bev15mg/kg 3週毎 最大6コース	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	パクリタキセル注射液:175mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 アバシチン点滴静注用:15mg/kg Day1
GYN039	【3週毎】レボルネン+80-ス/ス 200mg外来06子宮体癌	レボルネン20mg/day連日内服、80-ス/ス 200mg/body 3週毎	最小度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴:200mg Day1
GYN040	【6週毎】レボルネン+80-ス/ス 400mg外来06子宮体癌	レボルネン20mg/day連日内服、80-ス/ス 400mg/body 6週毎	最小度催吐性リスク	1	41	キイトルーダ点滴:400mg Day1
GYN042	TC+Pembro(3週毎)外来06子宮頸・子 宮体癌	子宮頸癌 3週毎	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	パクリタキセル注射液:175mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg Day1
GYN044	TC+Pembro+Bev（3週毎）外来06子 宮頸癌	Pembro200mg/body、PTX175mg/ m ² 、CBDCA : AUC=5、Bev15mg/kg 3週毎 最大8コース（PDまで）	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	パクリタキセル注射液:175mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 アバシチン点滴静注用:15mg/kg Day1
GYN046	Cemiplimab療法 外来06子宮頸癌	がん化学療法後に増悪した進行又は再 発の子宮頸癌 Cemiplimab : 350mg/body 3週ごと	最小度催吐性リスク	1	20	リブタヨ点滴静注:350mg Day1

GYN047	【3週毎】 $\text{A}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{D}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{A}^{\circ}$ 200mg【維持】外来06子宮頸癌	TC+Pembro,TP+Pembro療法後の維持療法（最大35J-ス） /wCDDP+Pembro療法後の維持療法（3-5J-ス）	最小度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴:200mg Day1
GYN048	【6週毎】 $\text{A}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{D}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{A}^{\circ}$ 400mg【維持】外来06子宮頸癌	TC+Pembro,TP+Pembro療法後の維持療法（最大15J-ス） /wCDDP+Pembro療法後の維持療法（6-20J-ス）	最小度催吐性リスク	1	41	キイトルーダ点滴:400mg Day1
GYN049	Pembro+Bev【維持】（3週毎）外来06子宮頸癌	Pembro200mg/body、Bev15mg/kg 3週ごと TC+Pembro+Bev療法後の維持療法（最大35コース）	最小度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
GYN050	TC+Durvalmab【3週毎】外来06子宮体癌	子宮体癌 3週毎 ※最大6J-ス	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	$\text{B}^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{A}^{\circ}\text{B}^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{A}^{\circ}$ 注射液:175mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 イミフィンジ点滴静注液:1120mg Day1
GYN051	Durva+Olaparib(pMMR) 療法【4週毎】外来06 子宮体癌	【子宮体癌】TC+Durvalmab療法【3週毎】→Durva+Olaparib(pMMR) 療法へ ※PDまで $\text{O}^{\circ}\text{P}^{\circ}\text{A}^{\circ}\text{R}^{\circ}\text{I}^{\circ}\text{B}^{\circ}$ 300mg/回 1日2回 連日投与	最小度催吐性リスク	1	27	イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1
GYN052	Durvalmab(dMMR) 療法【4週毎】外来06 子宮体癌	【子宮体癌】TC+Durvalmab療法【3週毎】→Durvalmab(dMMR) 療法へ ※PDまで	最小度催吐性リスク	1	27	イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1
GYN054	BEP（day9）外来06胚細胞腫瘍（卵巣）	3週毎 day1-5,16は別日 $\text{B}^{\circ}\text{E}^{\circ}\text{P}^{\circ}$	最小度催吐性リスク	1	6	ブレオ注射用:20mg/m ² Day1
GYN055	BEP（day16）外来06胚細胞腫瘍（卵巣）	3週毎 day1-5,9は別日 $\text{B}^{\circ}\text{E}^{\circ}\text{P}^{\circ}$	最小度催吐性リスク	1	5	ブレオ注射用:20mg/m ² Day1
GYN056	ACT-D（day1-5）（2週毎）外来06絨毛性疾患	day1-5連日投与 2週毎 最大10 $\text{C}^{\circ}\text{U}^{\circ}$	中等度催吐性リスク	5	9	コスメゲン:0.01mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
GYN061	ハラヴェン（2投1休）外来04子宮悪性軟部腫瘍	3週毎（day1,8投与） 化学療法歴のある子宮悪性軟部腫瘍 PDまで	軽度催吐性リスク	8	13	ハラヴェン静注:1.4mg/m ² Day1 Day8
GYN062	ハラヴェン（1回分）外来04子宮悪性軟部腫瘍	入院初回1回分 化学療法歴のある子宮悪性軟部腫瘍	軽度催吐性リスク	1	6	ハラヴェン静注:1.4mg/m ² Day1
GYN063	ADM【75mg/m ² 】（3週毎）外来06子宮肉腫	3週毎 最大6J-ス 子宮肉腫	高度催吐性リスク	1	20	ドキシソルピシン塩酸塩注射用:75mg/m ² Day1
GYN064	チソツマブ ベドチン【3週毎】外来06子宮頸癌	チソツマブベドチン: day1 ※PDまで	軽度催吐性リスク	1	20	デブダック点滴静注用:2mg/kg Day1