

当院コード	レジメン名	コメント	催吐性リスク	投与期間	コース期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
blo001	CHOP（2週毎）外来08悪性リンパ腫	ADM50mg/m2、CPA750mg/m2、VCR1.4mg/m2(max2mg/b)、d1-5：PSL100mg 14日目休薬完了 d2-5：PSL100mg処方	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	1	13	水溶性プレドニン：100mg Day1 オンコピン注：1.4mg/mi Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用：50mg/mi Day1 エンドキサン注：750mg/mi Day1
blo002	THP/COP（2週毎）外来08悪性リンパ腫	day1：THP-ADM、CPA、VCR、PSL100mg(d1-5) 14日目休薬完了 d2-5：PSL100mg処方	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	1	13	エンドキサン注：750mg/mi Day1 水溶性プレドニン：100mg Day1 オンコピン注：1.4mg/mi Day1 ピノルビン静注用：50mg/mi Day1
blo003	Pola-CHP療法（3週毎）外来08DLBCL	未治療のDLBCL 800mg/m2-1.8mg/kg、ドキシソルピシン50mg/mi、エンドキサン750mg/mi、【リツキシマブは別々の週で入力】 d2-5：PSL100mg処方	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	1	20	エンドキサン注：750mg/mi Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用：50mg/mi Day1 ソル・メドロール：125mg Day1 ボライビー点滴静注用：1.8mg/kg Day1
blo004	リツキシマブ（day1）外来08CD20陽性B細胞性リンパ腫	day1のみの CHOP、トリアムネンなどの併用の場合あり	最小度催吐性リスク	1	0	リツキシマブ注：375mg/mi Day1
blo005	リツキシマブBS（day1）外来08CD20陽性B細胞性リンパ腫	day1のみの CHOP、トリアムネンなどの併用の場合あり	最小度催吐性リスク	1	0	リツキシマブBS注：375mg/mi Day1
blo006	R（リツキシマブBS）-CHOP（3週毎）外来08B細胞性リンパ腫	21日目休薬完了、day1、最大 8クール d2-5：PSL100mg処方	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	1	20	ソル・メドロール：125mg Day1 リツキシマブBS注：375mg/mi Day1 オンコピン注：1.4mg/mi Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用：50mg/mi Day1 エンドキサン注：750mg/mi Day1
blo007	R（リツキシマブBS）-THP-COP（2週毎）外来08リンパ腫	14日目休薬完了、day1、最大 8クール d2-5：PSL100mg処方	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	1	13	ソル・メドロール：125mg Day1 リツキシマブBS注：375mg/mi Day1 オンコピン注：1.4mg/mi Day1 ピノルビン静注用：50mg/mi Day1 エンドキサン注：750mg/mi Day1
blo008	ベンダムシタ（3週毎d1-2）外来08悪性リンパ腫	3週毎（day1-2） 骨髄抑制の回復を待つ 6～12サイクル繰り返す	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	2	19	ベンダムシタ塩酸塩点滴静注液：90mg/mi Day1 Day2
blo009	リツキシマブ＋ベンダムシタ（4週毎d1-2）外来08リンパ腫	4週毎（day1-2） 6～8サイクル	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	2	26	リツキシマブBS注：375mg/mi Day1 ベンダムシタ塩酸塩点滴静注液：90mg/mi Day1 Day2
blo010	【初回】リツキシマブ＋ベンダムシタ＋800mg/m2-1.8mg/kg（3週毎）外来08リンパ腫	3週毎（初回） 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	3	18	リツキシマブBS注：375mg/mi Day1 ベンダムシタ塩酸塩点滴静注液：90mg/mi Day2 Day3 ボライビー点滴静注用：1.8mg/kg Day2
blo011	【2-6回目】リツキシマブ＋ベンダムシタ＋800mg/m2-1.8mg/kg（3週毎）外来08リンパ腫	3週毎（2-6サイクル目） 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	2	19	ベンダムシタ塩酸塩点滴静注液：90mg/mi Day1 Day2 リツキシマブBS注：375mg/mi Day1 ボライビー点滴静注用：1.8mg/kg Day1
blo012	ガザイバ（day1）外来08CD20陽性FL	day1のみの CHOP、ベンダムシタなどと併用の場合あり（CHOP、CVP併用：3週毎 ベンダムシタ併用：4週毎）	最小度催吐性リスク	1	0	ガザイバ点滴静注：1000mg Day1
blo018	GDP（2投1休）外来08悪性リンパ腫	最大16サイクル リツキシマブとの併用あり 救済化学療法	高度催吐性リスク	8	13	デキササート注射液：10ml Day1 Day2 Day3 Day4 ゲムシタピン点滴静注用：1000mg/mi Day1 Day8 シスプラチン点滴静注：75mg/mi Day1
blo023	A-CHP（3週毎）外来08悪性リンパ腫	700mg/m2-1.8mg/kg、ADM50mg/mi、CPA750mg/mi、d1-5：PSL100mg 21日目休薬完了 8コースまで d2-5：PSL100mg処方	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	1	20	ソル・メドロール125mg/V：1V Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用：50mg/mi Day1 エンドキサン注：750mg/mi Day1 アドセトリス点滴静注用：1.8mg/kg Day1
blo028	ボテリジオ（毎週）外来08ATL/T細胞性リンパ腫	週1回で8回繰り返す。再投与可能。	最小度催吐性リスク	1	6	ボテリジオ点滴静注 20mg：1mg/kg Day1
blo029	イストダックス（3投1休）外来08再発難治性未梢性T細胞リンパ腫	再発難治性未梢性T細胞リンパ腫 Romidepsin（day1,8,15：14mg/mi）4週毎	軽度催吐性リスク	15	13	イストダックス点滴静注用：14mg/mi Day1 Day8 Day15
blo030	ABVD（2週毎）外来0880リンパ腫	2週毎 最大16コース	高度催吐性リスク	1	13	ドキシソルピシン塩酸塩注射用：25mg/mi Day1 プレオ注射用：10mg/mi Day1 エクザール注：6mg/mi Day1 ダカルバジン注：375mg/mi Day1

blo031	アドセトリス（3週毎）外来08CD30 陽性HL・ALCL	最大16クール	軽度催吐性リスク	1	20	アドセトリス点滴静注用:1.8mg/kg Day1
blo032	A+AVD（4週毎）（1回分）外来08 ジ*キリンバ*腫	4週毎（day1, 15） 最大6コース（12回）	高度催吐性リスク	1	9	ドキシソルビン塩酸塩注射用:25mg/m ² Day1 エクザール注 :6mg/m ² Day1 ダカルバジン注用:375mg/m ² Day1 アドセトリス点滴静注用:1.2mg/kg Day1
blo033	Nivolumab（2週毎）240mg/body外 来13キ*キリンバ*腫	再発難治性ホジキンリンパ腫に対する nivolumab療法 【240mg/body】	最小度催吐性リスク	1	13	オブジーボ点滴静注用:240mg Day1
blo034	Pembrolizumab 200mg 3週毎 外来 08キ*キリンバ*腫	Pembrolizumab 200mg/body 3週毎 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫	最小度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴:200mg Day1
blo036	【11-13日目】I*キリンバ*療法【4週毎】 外来08NHL	I*キリンバ* : day1,8,15,22 PDまで	最小度催吐性リスク	22	6	エプキンリ皮下注4mg :0.16mg Day1 エプキンリ皮下注4mg :0.8mg Day8 エプキンリ皮下注48mg :1V Day15 Day22
blo037	【2-31-33日目】I*キリンバ*療法【4週 毎】外来08NHL	I*キリンバ* : day1,8,15,22 PDまで	最小度催吐性リスク	22	6	エプキンリ皮下注48mg :1V Day1 Day8 Day15 Day22
blo038	【4-91-93日目】I*キリンバ*療法【4週 毎】外来08NHL	I*キリンバ* : day1,15 PDまで	最小度催吐性リスク	15	13	エプキンリ皮下注48mg :1V Day1 Day15
blo039	【101-103日目以降】I*キリンバ*療法【4週 毎】外来 08NHL	【4週毎】I*キリンバ* : day1 PDまで	最小度催吐性リスク	1	27	エプキンリ皮下注48mg :1V Day1
blo041	ビダーザ皮下注（4週毎）外来08MDS	4週毎（day1-7）有効であれば継続	中等度催吐性リスク	7	21	ビダーザ注射用:75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
blo042	ビダーザ点滴（4週毎）外来08MDS	4週毎（day1-7） 有効であれば継続	中等度催吐性リスク	7	21	ビダーザ注射用:75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
blo049	VP（3週毎）外来08急性リンパ性白血病	3週毎 最大30クール	最小度催吐性リスク	1	20	水溶性ブレドニン注 :60mg/m ² Day1 オンコビン注 :1.4mg/m ² Day1
blo054	FC療法（4週毎）外来08CLL/ SLL	フルダラ>30mg/m ² , CPA250mg/m ² 28日 目休業完了	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準 拠	3	25	フルダラ静注用:30mg/m ² Day1 Day2 Day3 エンドキサン注:250mg/m ² Day1 Day2 Day3
blo055	ブ*ラト*サ*療法【7週毎】 外来 08PTCL	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫 day1,8,15,22,29,36 PDまで	最小度催吐性リスク	36	13	ジフォラタ注射液20mg:30mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
blo061	mCyBorD療法（3週毎）外来08MM	最大8コース PN出現時には、ボルテゾミ ブをday1,8,15,22へ変更可（別レジメ ン）	中等度催吐性リスク	11	10	デキサート注射液:10ml Day1 Day4 Day8 Day11 ボルテゾミブ注射用:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 エンドキサン注 :300mg/m ² Day1 Day8
blo062	KR d 療法（1コース目）外来08再発 難治性MM	デ*キ*メ*タ* >40mg : d1,8,15,22 カイ*ロリス 20mg/m ² : d1,2 27mg/m ² : d8,9,15,16 カイ*ロリス* : d1-21 21-以降 別レジ*メ	軽度催吐性リスク	16	12	デキサート注射液:10ml Day1 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用:20mg/m ² Day1 Day2 カイプロリス点滴静注用:27mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16
blo063	KR d 療法2～12コース 外来08再発 難治性MM	デ*キ*メ*タ* >40mg : d1,8,15,22 カイ*ロリス 27mg/m ² : d1,2,8,9,15,16 カイ*ロリス* : d1-21（4週毎） 131-以降別レジ*メ	軽度催吐性リスク	16	12	デキサート注射液:10ml Day1 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用:27mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
blo064	KR d 療法13コース以降 外来08再発 難治性MM	デ*キ*メ*タ* >40mg : d1,8,15,22 カイ*ロリス 27mg/m ² : d1,2,15,16 カイ*ロリス* : d1- 21（4週毎） 131-以降別レジ*メ	軽度催吐性リスク	16	12	デキサート注射液:10ml Day1 Day15 カイプロリス点滴静注用:27mg/m ² Day1 Day2 Day15 Day16
blo065	K d 療法（1kur目）外来08再発難治 性MM	デ*キ*メ*タ* >20mg : d 1,2,8,9,15,16,,22,23 カイ*ロリス 20mg/m ² : d1,2 56mg/m ² : d8,9,15,16 21-以降別レジ*メ	軽度催吐性リスク	16	12	デキサート注射液:4ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキサート注射液:1ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイプロリス点滴静注用:20mg/m ² Day1 Day2 カイプロリス点滴静注用:56mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16

blo066	Kd療法（2kur目以降）外来08再発難 治性MM	デキサメタゾン20mg：d 1,2,8,9,15,16,,22,23 ｶｲﾌﾞﾘｽ 56mg/m2：d1,2,8,9,15,16	軽度催吐性リスク	16	12	デキサート注射液:4ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキサート注射液:1ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイブロリス点滴静注:56mg/m Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
blo067	Kd (once weekly)療法（1kur目）外 来08再発難治性MM	デキサメタゾン40mg：d1,8,15,22 ｶｲﾌﾞﾘｽ 20mg/m2：d1 70mg/m2：d8,15 2ｺｰｽ 以降別ﾚｼﾒﾝ	軽度催吐性リスク	15	13	カイブロリス点滴静注用:20mg/m Day1 カイブロリス点滴静注用:70mg/m Day8 Day15
blo068	Kd (once weekly)療法（2kur目～） 外来08再発難治性MM	デキサメタゾン40mg：d1,8,15,22 ｶｲﾌﾞﾘｽ 70mg/m2：d1,d8,15	軽度催吐性リスク	15	13	カイブロリス点滴静注用:70mg/m Day1 Day8 Day15
blo070	Dara-VMP療法（cycle 2～9）外来 08MM	2-9サイクル（7-54週） Dara16mg/kg、ﾊﾞﾙﾍﾞｲﾄﾞ1.3mg/m、ﾌﾙﾀﾞ ｼﾞﾝ（経口）9mg/m、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾙ（経口） 60mg/m	軽度催吐性リスク	29	13	デキサート注射液:6ml Day1 Day22 バルケイド注射用:1.3mg/m Day1 Day8 Day22 Day29 ダラザレックス点滴静注:16mg/kg Day1 Day22
blo071	Dara-VMP療法（cycle 10～）外来 08MM	10サイクル（55週）～ Dara16mg/kgを 4週毎で継続	軽度催吐性リスク	1	27	デキサート注射液:6ml Day1 ダラザレックス点滴静注:16mg/kg Day1
blo073	DLd療法（2回以降）外来08再発又は 難治性MM	ﾍﾞﾗﾁﾐﾄﾞ（25mg/day day1-21）、ﾃﾞｷｽﾞ 20mg（day2のみ）処方 D:1～8週 weekly,9～24週biweekly,25週以上4w	軽度催吐性リスク	1	6	デキサート注射液:6ml Day1 ダラザレックス点滴静注:16mg/kg Day1
blo074	【11-ｽ目】scDLd療法【4週毎】外来 08MM	Dara：d1,8,15,22 DEX20mg： d1,2,8,9,15,16,22,23 ﾍﾞﾗﾁﾐﾄﾞd:1-21	軽度催吐性リスク	22	6	ダラキューロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15 Day22
blo075	【21-ｽ目】scDLd療法【4週毎】外来 08MM	Dara：d1,8,15,22 DEX20mg： d1,2,8,9,15,16,22,23 ﾍﾞﾗﾁﾐﾄﾞd:1-21	軽度催吐性リスク	22	6	ダラキューロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15 Day22
blo076	【3-61-ｽ目】scDLd療法【4週毎】外 来08MM	Dara：d1,15 DEX20mg： d1,2,8,9,15,16,22,23 ﾍﾞﾗﾁﾐﾄﾞd:1-21	軽度催吐性リスク	15	13	ダラキューロ配合皮下注:1V Day1 Day15
blo077	【71-ｽ目以降】scDLd療法【4週毎】 外来08MM	Dara：d1 DEX20mg： d1,2,8,9,15,16,22,23 ﾍﾞﾗﾁﾐﾄﾞd:1-21	軽度催吐性リスク	1	27	ダラキューロ配合皮下注:1V Day1
blo078	【11-ｽ目】scDBd療法【3週毎】外来 08MM	Dara：d1,8,15 DEX20mg：d 1,2,4,5,8,9,11,12,15 ﾎﾙﾃﾞｿﾐﾌﾞ 1.3mg/m：d1,4,8,11	軽度催吐性リスク	15	6	ボルテソミブ注射用:1.3mg/m Day1 Day4 Day8 Day11 ダラキューロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15
blo079	【2-31-ｽ目】scDBd療法【3週毎】外 来08MM	Dara：d1,8,15 DEX20mg：d 1,2,4,5,8,9,11,12,15 ﾎﾙﾃﾞｿﾐﾌﾞ 1.3mg/m：d1,4,8,11	軽度催吐性リスク	15	6	ボルテソミブ注射用:1.3mg/m Day1 Day4 Day8 Day11 ダラキューロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15
blo080	【4-81-ｽ目】scDBd療法【3週毎】外 来08MM	Dara：d1 DEX20mg：d 1,2,4,5,8,9,11,12 ﾎﾙﾃﾞｿﾐﾌﾞ1.3mg/ m：d1,4,8,11	軽度催吐性リスク	11	10	ボルテソミブ注射用:1.3mg/m Day1 Day4 Day8 Day11 ダラキューロ配合皮下注:1V Day1
blo081	【91-ｽ目以降】scDBd療法【4週毎】 外来08MM	Dara：d1 DEX20mg：d1	軽度催吐性リスク	1	27	ダラキューロ配合皮下注:1V Day1
blo082	【11-ｽ目】scDPd療法【4週毎】外来 08MM	Dara：d1,8,15,22 DEX20mg： d1,2,8,9,15,16,22,23 ﾎﾞﾗﾁﾐﾄﾞd:1- 21	軽度催吐性リスク	22	6	ダラキューロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15 Day22
blo083	【21-ｽ目】scDPd療法【4週毎】外来 08MM	Dara：d1,8,15,22 DEX20mg： d1,2,8,9,15,16,22,23 ﾎﾞﾗﾁﾐﾄﾞd:1- 21	軽度催吐性リスク	22	6	ダラキューロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15 Day22
blo084	【3-61-ｽ目】scDPd療法【4週毎】外 来08MM	Dara：d1,15 DEX20mg： d1,2,8,9,15,16,22,23 ﾎﾞﾗﾁﾐﾄﾞd:1- 21	軽度催吐性リスク	15	13	ダラキューロ配合皮下注:1V Day1 Day15

blo085	【73-81歳以降】scDPd療法【4週毎】 外来08MM	Dara : d1 DEX20mg : d1,2,8,9,15,16,22,23 ｶﾞﾌﾞﾘﾝｼﾃﾐﾄﾞ : d1-21	軽度催吐性リスク	1	27	ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1
blo086	scDKd療法（13-81歳）外来08MM	scDara : d1,8,15,22 DEX20mg : d1,2,8,9,15,16,22 ｶﾞﾌﾞﾘﾝｼﾃﾐﾄﾞ : d1,2 56mg/ml : d8,9,15,16	軽度催吐性リスク	22	6	デキサート注射液:6.000ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ｶﾞﾌﾞﾘﾝ点滴静注用:20mg/ml Day1 Day2 ｶﾞﾌﾞﾘﾝ点滴静注用:56mg/ml Day8 Day9 Day15 Day16 ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15
blo087	scDKd療法（23-81歳）外来08MM	scDara : d1,8,15,22 DEX20mg : d1,2,8,9,15,16,22 ｶﾞﾌﾞﾘﾝｼﾃﾐﾄﾞ : d1,2,8,9,15,16	軽度催吐性リスク	22	6	デキサート注射液:6ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ｶﾞﾌﾞﾘﾝ点滴静注用:56mg/ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15 Day22
blo088	scDKd療法（3-63-81歳）外来08MM	scDara : d1,15 DEX20mg : d1,2,8,9,15,16 40mg : d22 ｶﾞﾌﾞﾘﾝｼﾃﾐﾄﾞ : d1,2,8,9,15,16	軽度催吐性リスク	16	12	デキサート注射液:6ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ｶﾞﾌﾞﾘﾝ点滴静注用:56mg/ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1 Day15
blo089	scDKd療法（73-81歳以降）外来08MM	scDara : d1 DEX20mg : d1,2,8,9,15,16 40mg : d22 ｶﾞﾌﾞﾘﾝｼﾃﾐﾄﾞ : d1,2,8,9,15,16	軽度催吐性リスク	16	12	デキサート注射液:6.000ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ｶﾞﾌﾞﾘﾝ点滴静注用:56mg/ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1
blo090	IsaPd療法（13-81歳）外来08再発難治性MM	Isa : d1,8,15,22 DEX40mg : d1,8,15,22（75歳以上の症例などではDEX50%に減量） ｶﾞﾌﾞﾘﾝｼﾃﾐﾄﾞ : d1-21内服	軽度催吐性リスク	22	6	サークルサ点滴静注:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液:10ml Day1 Day8 Day15 Day22
blo091	IsaPd療法（23-81歳以降）外来08再発難治性MM	Isa : d1,15 DEX40mg : d1,8,15,22（75歳以上の症例などではDEX50%に減量） ｶﾞﾌﾞﾘﾝｼﾃﾐﾄﾞ : d1-21内服	軽度催吐性リスク	15	13	サークルサ点滴静注:10mg/kg Day1 Day15 デキサート注射液:10ml Day1 Day15
blo092	IsaKd療法（13-81歳）外来08再発難治性MM	Isa : d1,8,15,22 DEX20mg : d1,2,8,9,15,16,22,23 ｶﾙﾌｨﾙｼﾞﾐﾝ 20mg/ml : d1,2 56mg/ml : d8,9,15,16	軽度催吐性リスク	22	6	ｶﾞﾌﾞﾘﾝ点滴静注用:20mg/ml Day1 Day2 サークルサ点滴静注用:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液:5ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 ｶﾞﾌﾞﾘﾝ点滴静注用:56mg/ml Day8 Day9 Day15 Day16
blo093	IsaKd療法(23-81歳以降)外来08再発難治性MM	Isa : d1,15 DEX20mg : d1,2,8,9,15,16,22,23 ｶﾙﾌｨﾙｼﾞﾐﾝ 56mg/ml : d1,2,8,9,15,16	軽度催吐性リスク	16	12	ｶﾞﾌﾞﾘﾝ点滴静注用:56mg/ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 サークルサ点滴静注用:10mg/kg Day1 Day15 デキサート注射液:5ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
blo094	Isa+d療法（13-81歳）外来08再発難治性MM	Isa : d1,8,15,22 DEX40mg : d1,8,15,22（75歳以上の症例などではDEX50%に減量）	軽度催吐性リスク	22	6	サークルサ点滴静注:20mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液:10ml Day1 Day8 Day15 Day22
blo095	Isa+d療法（23-81歳以降）外来08再発難治性MM	Isa : d1,15 DEX40mg : d1,8,15,22（75歳以上の症例などではDEX50%に減量）	軽度催吐性リスク	15	13	サークルサ点滴静注:20mg/kg Day1 Day15 デキサート注射液:10ml Day1 Day15
blo096	Isa単剤療法（13-81歳）外来08再発難治性MM	Isa : d1,8,15,22	軽度催吐性リスク	22	6	サークルサ点滴静注:20mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22
blo097	Isa単剤療法（23-81歳以降）外来08再発難治性MM	Isa : d1,15	軽度催吐性リスク	15	13	サークルサ点滴静注:20mg/kg Day1 Day15
blo098	ER d療法（1,2コース目）外来08再発難治性MM	ﾃﾞｻﾞﾒﾀﾞﾐﾝ28mg : d0,7,14,21 ﾍﾙﾌﾞﾘﾝｼﾃﾐﾄﾞ : d1,21 (4週毎) 33-81歳以降別ｼｰﾏ	軽度催吐性リスク	22	6	デキサート注射液:2ml Day1 Day8 Day15 Day22 エムブリシチ点滴静注用:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22
blo099	ER d療法（3コース目以降）外来08再発難治性MM	ﾃﾞｻﾞﾒﾀﾞﾐﾝ28mg : d0,14 ｳﾞｪﾙﾌﾞﾘﾝｼﾃﾐﾄﾞ : d1,21 40mg : d8,22 ﾍﾙﾌﾞﾘﾝｼﾃﾐﾄﾞ : d1,21 (4週毎)	軽度催吐性リスク	15	13	デキサート注射液:2ml Day1 Day15 エムブリシチ点滴静注用:10mg/kg Day1 Day15
blo100	EPd療法（33-81歳～ 50kg未満）外来08再発難治性MM	DEX28mg : d0-1 40mg : d8,15,22 ﾍﾙﾌﾞﾘﾝｼﾃﾐﾄﾞ : d1 ｶﾞﾌﾞﾘﾝｼﾃﾐﾄﾞ : d1-21 (4週毎)	軽度催吐性リスク	1	27	デキサート注射液:2ml Day1 エムブリシチ点滴静注用:20mg/kg Day1
blo101	EPd療法（33-81歳～ 50kg～90kg）外来08再発難治性MM	DEX28mg : d0-1 40mg : d8,15,22 ﾍﾙﾌﾞﾘﾝｼﾃﾐﾄﾞ : d1 ｶﾞﾌﾞﾘﾝｼﾃﾐﾄﾞ : d1-21 (4週毎)	軽度催吐性リスク	1	27	デキサート注射液:2ml Day1 エムブリシチ点滴静注用:20mg/kg Day1

blo102	EPd療法（30歳～ 90kg超）外来08 再発難治性MM	DEX28mg : d0-1 28mg : d8,15,22 1L7 リシテ20mg/kg : d1 8°マリ°ミト° : d1-21 (4週毎)	軽度催吐性リスク	1	27	デキサート注射液:2ml Day1 エムブリシディ点滴静注用:20mg/kg Day1
blo104	scDCyBorD療法（C1、2）外来08原 発性アミロイドーシス	1、2クール目（4週毎）ダラキ1-01800mg、 ヘルケイト1.3mg/ml、エンドキサン300mg/ml、 デキサート40mg/week	中等度催吐性リスク	23	5	デキサート注射液:6ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15 Day22 エンドキサン注 :300mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 ヘルケイト注射用:1.3mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22
blo105	scDCyBorD療法（C3-6）外来08原 発性アミロイドーシス	3-6クール目（4週毎）ダラキ1-01800mg (d1.15)、ヘルケイト1.3mg/ml、エンドキ サン300mg/ml、デキサート40mg/week	中等度催吐性リスク	22	6	デキサート注射液:6ml Day1 Day15 ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1 Day15 ヘルケイト注射用:1.3mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 エンドキサン注 :300mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液:12ml Day8 Day22
blo106	scDCyBorD療法（C7-）外来08原 発性アミロイドーシス	7クール目以降（4週毎）ダラキ1-01800mg (d1)のみ	軽度催吐性リスク	1	27	ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1
blo107	MTX髄注（4W）外来08白血病・ ML・がん性髄膜炎	4週毎（最大15クール） Total 4mL 和 ト併用のことあり	最小度催吐性リスク	1	27	メソトレキセート注 :15mg Day1 デキサート注射液:3.3mg Day1
blo120	【11-18日 FL1-3A】17°リタマ°療法【4 週毎】外来08NHL	17°リタマ° : day1,8,15,22 PDまで	最小度催吐性リスク	22	6	エプキンリ皮下注4mg :0.16mg Day1 エプキンリ皮下注4mg :0.8mg Day8 エプキンリ皮下注4mg :3.0mg Day15 エプキンリ皮下注48mg :1V Day22